

感染性胃腸炎予防のための消毒

- ・使用する薬剤は「次亜塩素酸ナトリウム」ですが、**家庭では「台所用漂白剤」**をうすめて使います。
- ・「ミルトン」「ミルクポン」等が「次亜塩素酸ナトリウム」です（乳児のほ乳びんや乳首の消毒用）。必要濃度にするのに漂白剤よりたくさん必要で、価格も高いので、わざわざ購入しなくてもよいでしょう。
- ・「ミルトン」「ミルクポン」はうすめた溶液が低濃度（ほ乳びんの消毒濃度程度）だと、24 時間を過ぎると塩素の分解が進んで消毒効果がなくなっていくます。（希釈溶液の長期保存ができません）
- ・台所用漂白剤は薄めておいても保存がききます。

※使い捨ての手袋・マスクをして作業しましょう。

※家具等への使用は濃度を守っても漂白されることがあるので注意が必要です。5分放置してから仕上げの水拭きをしましょう。

※漂白剤を使う時は換気をしっかりしましょう。

	家具、ドアノブ、床、食器、調理器具等の消毒	患者の吐いた物、便の消毒 (乾燥すると菌が空気中に舞い上がるので、高濃度の溶液にひたして、感染力をなくす。)
次亜塩素酸ナトリウム濃度	200ppm	1,000ppm
台所用漂白剤 (ハイター・ブリーチなど)	水1ℓに3cc	水1ℓに 16cc
	水2ℓに6～7cc	水2ℓに 33cc
ミルトン・ミルクポンなど	水1ℓに 20cc	水1ℓに 100cc
	水2ℓに 40cc	水2ℓに 200cc

※調理器具、食器、ふきん等は熱湯消毒も有効です。(85℃以上で1分間の加熱が必要です。)