



令和8年度予防接種

問い合わせ先： 南知多町保健センター 65-0711(代)(内線511~514)

町外医療機関（接種協力医療機関に限る）での接種【広域予防接種】、または町内医療機関での接種になります。保護者が、医療機関へ事前に予約をし接種して下さい。

★日間賀島・篠島に在住の方が、在住島以外の医療機関で接種した場合、高速船の料金が一部助成されます（要申請）。

＜接種時に必要な物＞「母子健康手帳」「予診票」「マイナ保険証または資格確認書」「子ども医療費受給者証」「診察券（必要時）」「広域予防接種連絡票（広域予防接種の場合）」*注意* 予診票は、広域予防接種と町内予防接種とでは様式が異なります。 広域予防接種連絡票は、発行に手続きが必要です。

(発行場所：保健センター)

広域予防接種（愛知県）とは

事前に保健センターへ申請し、町外の接種協力医療機関（愛知県内に限る）で接種します。

- 対象者：①南知多町外にかかりつけ医がいる方
②里帰り出産、家庭内暴力等のため、町外接種を希望する方
③長期に入院治療を要する方
- 接種協力医療機関：愛知県医師会ホームページでご確認下さい。
- 手続き：接種希望医療機関が接種可能か確認したうえで、保健センター窓口にて「広域予防接種連絡票」を発行し、病院へ行って下さい。
(発行時に必要な物：「母子健康手帳」)

広域予防接種(町外)でのみ実施する予防接種

ロタウイルス

B型肝炎

小児用肺炎球菌

5種混合(R6.4月~)

BCG

麻しん風しん混合 1期

水痘(水ぼうそう)

日本脳炎 1期(1回目・2回目・追加) R3. 4~広域予防接種になりました。

個別通知：無

予診票：あかちゃん訪問にて

冊子「広域予防接種予診票」を配布

★広域予防接種連絡票は、あかちゃん訪問時発行。
あかちゃん訪問時に未発行の場合は、乳幼児健診時、または保健センター・サービスセンター窓口で発行します。



町内予防接種とは

下記の医療機関で接種します。(要予約)

■注意：個別通知に同封の予診票を必ず持参して下さい。



大岩医院(内海)	内海字亥新田115-1	62-0138
大岩医院(豊浜)	豊浜字上大田面12-1	65-0184
上床医院(豊浜)	豊浜字中村23-1	65-0604
白井医院(師崎)	師崎字向島1	63-0029
夏目医院(大井)	大井字江崎24	63-0335
知多厚生病院附属篠島診療所	篠島字神戸301-1	67-2267
日間賀島診療所	日間賀島字東側123	68-2345

★南知多病院は、実施していません。

町内予防接種または広域予防接種(町外)で実施する予防接種

麻しん風しん混合 2期

日本脳炎 2期

2種混合(ジフテリア・破傷風混合)

子宮頸がん

個別通知：有

予診票：町内の場合⇒個別通知に同封
広域の場合⇒保健センター窓口で配布

★広域予防接種連絡票は、保健センター・サービスセンター窓口で発行。

★突発性発疹・水ぼうそう・手足口病などの感染症にかかった場合は、予防接種が受けられない場合があります、事前に医療機関にお問い合わせ下さい。

定期予防接種

★医療機関に各自で予約して下さい。

★持ち物：母子健康手帳・予診票・マイナ保険証または資格確認書・子ども医療費受給者証・診察券（あれば）・広域予防接種連絡票（広域予防接種の場合）



※ 慢性疾患等で接種期間内に接種できない方は保健センターへお問い合わせください。
 ※ 麻疹風しん・水痘・日本脳炎・2種混合・子宮頸がんにつきましては、町内の医療機関または、町外の医療機関での広域予防接種の選択ができます。

予防接種名	種類	対象者	標準的接種年齢	接種回数	個別通知有無	接種方法	接種場所	予診票配布方法	接種間隔・その他
ロタウイルス (R2.10月～)	生	1価 生後6週～24週まで 5価 生後6週～32週まで	1価 生後6週～24週まで 5価 生後6週～32週まで	1価(ロタリックス) 2回 5価(ロタテック) 3回	無	広域	町外	1価(ロタリックス) 27日以上あけて2回 5価(ロタテック) 27日以上あけて3回 ★初回接種は生後6週から14週6日までに行う。 ★令和2年8月1日以降に生まれた方が対象です	
B型肝炎	不活化	生後0～12か月に至るまで	生後2～9か月 1回目 2か月 2回目 3か月 3回目 7～8か月	3回	無	広域	町外	1回目と2回目 27日以上 1回目と3回目 139日以上(20週後)	
5種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ・ヒブ) (R6.4月～)	不活化	生後2～90か月に至るまで	初回 生後2～7か月 追加 1期初回終了後 6～18か月の間隔	初回 3回 追加 1回	無	広域	町外	<1期初回> 20日以上(20～56日までの間隔)で3回 <1期追加> 1期初回接種(3回)終了後6か月以上の間隔をおく	
小児用肺炎球菌	不活化	生後2か月～生後60月に至るまで	初回 生後2～7か月 追加 1期初回終了後 60日以上の間隔 (1歳以降)	初回 3回 追加 1回 (初回接種開始の月齢により異なる)	無	広域	町外	<小児用肺炎球菌> 2か月～7か月未満 : 初回3回(27日以上の間隔) + 追加(60日以上の間隔) 1回 ※1歳以降 7か月～1歳未満 : 初回2回(27日以上の間隔) + 追加(60日以上の間隔) 1回 1歳～2歳未満 : 初回2回(60日以上の間隔) 2歳～5歳未満 : 1回 接種開始時期の年齢により接種回数が違います!	
ヒブ: Hib (インフルエンザ菌b型) ※5種混合の場合不必要	不活化	生後2か月～5歳に至るまで	初回 生後2～7か月 追加 1期初回終了後 7月～13月の間隔	初回 3回 追加 1回 (初回接種開始の月齢により異なる)	無	広域	町外	<ヒブ> 2か月～7か月未満: 初回3回(27日以上の間隔) + 追加(初回終了後7月以上の間隔) 1回 7か月～1歳未満: 初回2回(27日以上の間隔) + 追加(初回終了後7月以上の間隔) 1回 1歳～5歳未満: 1回 接種開始時期の年齢により接種回数が違います!	
4種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ) ※5種混合の場合不必要	不活化	生後2～90か月に至るまで	初回 生後2～12か月 追加 1期初回終了後 12～18か月の間隔	初回 3回 追加 1回	無	広域	町外	<1期初回> 20日以上(20～56日までの間隔)で3回 <1期追加> 1期初回接種(3回)終了後6か月以上の間隔をおく	
BCG	生	生後1年に至るまで	生後5～8か月未満	1回	無	広域	町外		
麻しん(はしか) 風しん	生	1期 生後12か月～24か月に至るまで 2期 保育所の年長児に相当する年齢	1期 生後12か月～24か月に至るまで 2期 保育所の年長児に相当する年齢	1期 1回 2期 1回	1期 有 2期 有	広域	町外		
水痘 (水ぼうそう)	生	生後12か月～36か月に至るまで	1回目 生後12～15か月 2回目 1回目終了後6～12か月	2回	無	広域	町外	3か月以上の間隔で2回	
日本脳炎	不活化	1期 生後6か月～90か月に至るまで 2期 9～13歳未満	1期初回 3歳 1期追加 4歳 2期 9歳	1期初回 2回 1期追加 1回 2期 1回	1期 有 2期 有	広域	町外	<1期初回> 6日以上(6～28日までの間隔)で2回 <1期追加> 1期初回接種(2回)終了後6月以上(おおむね1年後(11～13か月後)) 【特例】H7 . 4. 2～H19. 4. 1生 未接種分9歳～20歳未満の間で接種可	
2種混合 (ジフテリア破傷風)	不活化	11歳以上 13歳未満	11歳～12歳に至るまで	1回	無	個別	町内	5種混合、4種混合、3種混合の2期として接種	
子宮頸がん ※	不活化	小学6年生～高校1年生に相当する年齢	中学校1年生	3回	無	個別	町内	【シルガード9】9価(3回) 2回目: 1回目から2か月 3回目: 1回目から6か月 9価(2回)(15歳未満) 2回目: 1回目から6か月	

※ 4種混合ワクチンは、R7. 7月に販売中止になりました。5種混合ワクチンに切り替えて接種してください。

予防接種スケジュール（定期予防接種） ↔ : 標準的な接種期間

■ : 法の対象年齢



種類	回数	出生時	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	3か月	6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳		
ロタウイルス	生 □1回目 □2回目 (□3回目)	1価	①	②																													
ヒブ: Hib (インフルエンザ菌b型) 5種混合の場合不必要 ※	不活化 □1回目 □2回目 □3回目 □追加		①	②	③									④																			
小児用肺炎球菌	不活化 □1回目 □2回目 □3回目 □追加		①	②	③									④																			
B型肝炎	不活化 □1回目 □2回目 □3回目		①	②						③																							
BCG	生 □1回						①																										
5種混合 (百日咳・ジフテリア 破傷風・不活化ポリオ・ヒ ブ)	不活化 □1回目 □2回目 □3回目 □追加		①	②	③									④																			
麻疹(はしか) 風しん	生 □1期 □2期													①	1期																		
水痘 (水ぼうそう)	生 □1回目 □2回目													①	②																		
日本脳炎	不活化 □1回目 □2回目 □追加 □2期																1期	①	②	③							④	2期					
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	不活化 □1回																																
子宮頸がん ※	不活化 □1回目 □2回目 □3回目																																

1歳以上2歳未満
1歳になったらなるべく
早めに接種を!

5歳以上7歳未満で
小学校入学前の1年間
(4/1~3/31)

接種間隔 ※重要

異なる種類のワクチンを
接種する場合の間隔

※注意※

★同じ種類のワクチンは、それぞれの種類ごとに決められた接種間隔を教えてください。

注射生ワクチン

BCG
麻疹風しん(混合)
麻疹
風しん
水痘(水ぼうそう)

(任意)
おたふくかぜなど

(注射) 生ワクチン

★注射生ワクチンを接種した日の翌日から起算して、注射生ワクチンの予防接種を行う日までの間隔は、27日以上おく

(経口又は経鼻) 生ワクチン
不活化ワクチン・トキソイド
mRNAワクチン

★注射生ワクチンを接種した日の翌日から起算して、経口・経鼻・生・不活化ワクチンの予防接種を行う日までの間隔は、制限なし

不活化ワクチン
経口生ワクチン

(経口又は経鼻生ワクチン)
ロタウイルス
経鼻弱毒性インフルエンザ
(不活化ワクチン)
ヒブ・小児用肺炎球菌
B型肝炎・5種混合
日本脳炎・2種混合
子宮頸がん
(任意) インフルエンザなど

(注射・経口又は経鼻) 生ワクチン

不活化ワクチン
トキソイド
mRNAワクチン

制限なし

不活化・経口・経鼻生ワクチンを接種した日の翌日から起算して、別の種類の予防接種を行う日までの間隔は、制限なし



南知多町での7歳6か月までの予定（目安）



広域
予
防
接
種

2か月頃
5種混合① (年 月 日)
肺炎球菌① (年 月 日)
B型肝炎① (年 月 日)
ロタウイルス① (年 月 日)

3か月頃
5種混合② (年 月 日)
肺炎球菌② (年 月 日)
B型肝炎② (年 月 日)
ロタウイルス② (年 月 日)

4か月頃
5種混合③ (年 月 日)
肺炎球菌③ (年 月 日)
ロタウイルス③ (年 月 日)
(ロタテックの場合)

5か月頃 BCG (年 月 日)

7～8か月頃 B型肝炎③ (年 月 日)

1歳頃
麻しん風しん(1期) (年 月 日)
水痘① (年 月 日)
肺炎球菌追加 (年 月 日)
5種混合 (年 月 日)

1歳6か月頃 水痘② (年 月 日)

3歳頃 日本脳炎① (年 月 日)

日本脳炎② (年 月 日)

4歳頃 日本脳炎追加 (年 月 日)

5歳頃 麻しん風しん(2期) (年 月 日)
(年長児) (町内または広域を選択) 通知有

広域（町外接種協力医療機関で実施）

5種混合①②③追加
肺炎球菌①②③追加
B型肝炎①②③
BCG
ロタウイルス①② (③)
麻しん風しん1期
水痘①②
日本脳炎①②・追加



★個別通知：無
あかちゃん訪問・健診にて説明

町内（町内医療機関で実施）

または

広域（町外接種協力医療機関で実施）

日本脳炎2期
麻しん風しん（2期）
2種混合



★個別通知：有

広域予防接種を希望の場合は、保健センター・サービスセンター窓口にて申請が必要です。
(持ち物：母子健康手帳)

町内・広域
予防接種