

風しん抗体検査・予防接種のご案内

日本から、風しん、先天性風しん症候群をなくしましょう

成人男性への風しん対策

風しんとは？

風しんは三日はしかとも呼ばれます。

風しんは妊娠初期に感染すると、胎児に先天性風しん症候群（心臓疾患、難聴、白内障など）をもたらします。風しんは4～5年おきに流行を繰り返してきました。平成24年から平成25年の流行では全国で16,730人が発症し、45名の先天性風しん症候群のお子さんが生まれました。

あなたが風しんの感染を拡大させてしまう可能性があります！

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれのお子様へ

あなたと、これから生まれてくる世代の子どもを守るために風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう！

この年代の男性の皆様には、過去に公的な予防接種が行われていないため、自分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまうおそれがあります。

抗体検査と予防接種の実施

国は、令和4年度から3年間かけて、1回も予防接種を受けていない39歳から56歳の男性に対し、風しん抗体検査（無料）を実施し、抗体価が基準に該当しない人（検査者の約20%）に対し、予防接種（無料）を行います。

【対象者】昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性

次のいずれかに該当する方は、抗体検査の対象外となります。

- 風しんの罹患歴（かかったこと）の正式な記録がある方
- 過去に風しんの予防接種を受けたことがあり、その記録がある方
- 平成26年4月以降に受けた抗体検査の結果の記録がある方


クーポン券の使用期限

抗体検査・予防接種 ▶ **令和7年3月31日（月）まで**

ご不明な点は、健康子育て室 健康推進係 <0569>65-0711（代）までお問い合わせください。

受診方法

- ・抗体検査は下表の1または2の方法で受けることができます。
- ・クーポン券が使えるかどうか、医療機関や職場に確認の上で検査を受けてください。
- ・クーポン券を忘れた場合は無料で抗体検査・予防接種を受けられませんのでご注意ください。



※全国の協力医療機関：厚生労働省のホームページ（風しんの追加的対策について）でご確認ください。

南知多町で抗体検査・予防接種が受けられる医療機関

医療機関	住 所	電話番号
大岩医院 (内海)	内海字亥新田115-1	62-0138
(医) 上床医院	豊浜字中村23-1	65-0604
(医) 大岩医院 (豊浜)	豊浜字上大田面12-1	65-0184
(医) 共生会 みどりの風 南知多病院	豊丘字孫廻間86	65-1111
(医) 羽栗会 夏目医院	大井字江崎24	63-0335
白井医院	師崎字向島1	63-0029
知多厚生病院	美浜町大字河和字西谷81-6	82-0395
かつばのお家クリニック	師崎字神戸浦34	47-7430

予防接種の注意事項（予防接種救済制度）

〈予防接種を受ける前に〉

風しんの抗体検査を受けた結果、風しんの抗体価が基準に該当しない場合には定期予防接種の対象となります。接種するワクチンは麻しん・風しん混合ワクチン（MR）です。以下の内容をお読みいただき、併せて、厚生労働省のホームページ等の情報から予防接種の有効性、起こりうる副反応を確認してください。

1. 予防接種を受けることができない場合（1項目でも該当があれば接種はできません）

- ①接種当日、明らかな発熱を呈している（通常37.5℃以上の場合）
- ②重篤な急性疾患にかかっている
- ③麻しん・風しん混合ワクチンの成分によってアナフィラキシー様反応を呈したことがある
- ④風しんに係る抗体検査を受けた結果、基準を超える抗体価が認められる
- ⑤その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある

2. 予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなくてはならない場合

- ①心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患がある
- ②予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を呈したことがある
- ③過去にけいれん（ひきつけ）の既往がある
- ④過去に免疫不全の診断がなされている人及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる
- ⑤このワクチンの成分に対してアレルギーをおこすおそれがある



〈予防接種を受けた後の注意点〉

- ①予防接種を受けた後、急な副反応が30分以内に起こることがあります。医師（医療機関）とすぐに連絡が取れるようにしておきましょう。

【ワクチンの副反応】

発疹、発熱等が多い副反応です。ほかの副反応としては、注射部位の発赤・腫脹、硬結などの局所反応、じんましん、リンパ節腫脹、関節痛、倦怠感があります。重大な副反応としてごくまれに、ショック、アナフィラキシー血小板減少性紫斑病、脳炎・脳症、けいれんが起こる場合があります。

- ②接種後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、体調変化が現われた場合は、速やかに接種した医師（医療機関）の診察を受けてください。
- ③入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすことはやめましょう。
- ④接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動は避けましょう。

【問合せ】 南知多町健康子育て室（保健センター） TEL (0569) 65-0711