

可燃ごみの組成分析結果（令和2年3月実施）

上段：地区名、下段：試料採取日

| 種 別              |              | 単位 | 内海          | 豊浜          | 師崎          | 篠島          | 日間賀島        | 町内<br>平均 |
|------------------|--------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                  |              |    | 3月3日<br>(火) | 3月2日<br>(月) | 3月3日<br>(火) | 3月2日<br>(月) | 3月3日<br>(火) |          |
| 1袋平均重量（45ℓサイズ）   |              | kg | 4.0         | 6.3         | 6.2         | 7.5         | 8.2         | 6.4      |
| 重<br>量<br>割<br>合 | ①新聞紙         | %  | 0.8         | 7.3         | 4.4         | 4.5         | 4.0         | 4.2      |
|                  | ②雑誌          | %  | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      |
|                  | ③紙パック        | %  | 1.0         | 1.0         | 0.5         | 0.1         | 0.9         | 0.7      |
|                  | ④段ボール        | %  | 2.9         | 0.3         | 1.4         | 1.4         | 5.2         | 2.3      |
|                  | ⑤布類          | %  | 1.1         | 1.7         | 0.0         | 3.3         | 6.7         | 2.5      |
|                  | ⑥汚れた紙・臭いの強い紙 | %  | 8.0         | 12.5        | 10.8        | 6.9         | 4.1         | 8.5      |
|                  | ⑦ミックスペーパー    | %  | 10.4        | 0.2         | 1.4         | 0.2         | 1.8         | 2.8      |
|                  | ⑧ビニール・ゴム・皮革  | %  | 6.5         | 9.7         | 3.9         | 6.6         | 3.0         | 6.0      |
|                  | ⑨木・竹・わら      | %  | 12.1        | 0.2         | 5.3         | 0.1         | 0.7         | 3.7      |
|                  | ⑩合成樹脂        | %  | <0.1        | 0.6         | 2.5         | 0.2         | 0.0         | 0.7      |
|                  | ⑪プラスチック製容器包装 | %  | 4.2         | 6.5         | 6.0         | 2.8         | 3.3         | 4.6      |
|                  | ⑫ペットボトル      | %  | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.3         | 0.5         | 0.1      |
|                  | ⑬厨芥類         | %  | 52.8        | 56.8        | 63.5        | 73.6        | 69.0        | 63.1     |
|                  | ⑭不燃物類        | %  | 0.2         | 3.2         | 0.3         | 0.0         | 0.7         | 0.9      |
|                  | ⑮その他         | %  | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      |

試料：各地区10袋の可燃ごみを調査

※四捨五入のため、合計が100.1%です。

| 資源に分別できるもの（上表赤字） |              | (%)  |
|------------------|--------------|------|
| 紙<br>類           | ①新聞紙         | 4.2  |
|                  | ③紙パック        | 0.7  |
|                  | ④段ボール        | 2.3  |
|                  | ⑦ミックスペーパー    | 2.8  |
|                  | 紙類 計         | 10.0 |
| プ<br>ラ           | ⑪プラスチック製容器包装 | 4.6  |
|                  | ⑫ペットボトル      | 0.1  |
| 合計               |              | 14.7 |

ごみ減量のポイント

○資源は分別を徹底しましょう。

14.7%（左表）が焼却されています。

○食品ロスを減らしましょう。

可燃ごみの63.1%が厨芥類（生ごみ）です。

農水省と環境省の推計で、食品ロスは36%。

$63.1\% \times 36\% = 22.7\%$

可燃ごみのうち22.7%が食品ロス。

| 厨芥類の水分量 |        |
|---------|--------|
| 乾燥前     | 5,014g |
| 乾燥後     | 1,098g |
| 水分比率    | 78%    |

○生ごみは、水切りをしましょう。

厨芥類（生ごみ）の約80%が水分です。

少しでも、水分を切って捨てましょう。

絞る、濡れたまま捨てない（乾燥を）